

Sra Consellera,

El passat 8 d'octubre, un Institut Norteamericà dedicat a la recerca biomèdica en relació a buscar les causes que provoquen el SFC, va trobar en el 67 % de malalts en primera instància al nucli dels limfocits i en un 98 %, en estudis posteriors a la membrana cel·lular, un nou retrovirus, el que van anomenar XMRV d'origen murí.

El virus l'havien descobert uns anys abans en uns tipus determinat de càncer agressiu de pròstata.

Aquest virus l'han trobat a dins dels limfòcits B y T, tot i que ara estan buscant dins de les NK (hi han moltíssims estudis que ja havien demostrat una activitat molt minvada en aquest tipus de cèl·lules en malalts de CFS).

S'ha aïllat a la sang, fluids corporals, i saliva. Per tant, la seva contagiositat, si s'acabés demostrant el que apunten aquests investigadors, seria més que preocupant; una dada, és que també s'ha trobat en un 3,7 % de persones sanes, que podrien actuar com a portadors, no desenvolupant la malaltia, és a dir, la simptomatologia; però, s'ha trobat que podrien tenir mancances en el seu sistema immunitari i tenir una prevalença molt més elevada de patir càncer.

Aquests investigadors, dirigits per la Dra. Judy Mikovitz, juntament amb la Agència Nacional del Càncer NordAmericana i la Universitat de Cleveland, van comentar fa un parell de dies en una conferència a Califòrnia, que els malalts de SFC, estan morint de càncer a l'edat dels 40 anys.

Els estan investigant en relació a aquest virus i diuen que el tractament, passaria pels antiretrovirals, obviament aquells que es puguin ajustar a aquest tipus de virus, ja que a diferència del VIH que és un virus complex de la família del retrovirus, aquest és un retrovirus simple de la família dels gammaretrovirus, i per tant, en teoria, amb menor capacitat per mutar que el VIH i per tant amb un tractament més senzill.

Perdoni si personalitzo; jo tinc 41 anys i vaig començar amb aquesta simptomatologia fa 6.

M'han operat dues vegades de carcinomes malignes, un testicular amb l'extirpació d'un testicle i un altre en el tiroides amb l'extirpació total de la glàndula, fa poc més d'un any.

Actualment, una clínica privada catalana (Institut Ferran de Reumatologia a través de la clínica CIMA) ja ha "ofertat" una analítica per detectar el virus, a un preu de 860 euros.

Per una altra banda, trobem que els metges, ja siguin els de capçalera com els especialistes, no saben res de tot això, i és quelcom, com es pot imaginar, que ens aterroritza, ja que no sabem si estem contagiats o no, si estem encomanant la malaltia a les nostres famílies o a la població en general, i si morirem de càncer la setmana pròxima.

Encara hi han metges que no creuen en la malaltia, que segueixen aplicant la TCC i que creuen que el que passa realment és una somatització de la persona, que per una altra banda el que no vol és anar a treballar.

Sra Geli, el que demano, en nom de molts malalts és el següent:

- 1.- Demanem que vosté, con a consellera i màxima responsable de la Sanitat Catalana, parli amb les persones que puguin coordinar, a través dels hospitals de la Xarxa Pública (Vall d'Hebron, Hospital Clinic, H. de Sant Pau etc, etc) unitats, entenc que formada per viròlegs, especialistes en VIH, immunòlegs, oncòlegs, per tal de poder-nos valorar, diagnosticar, i veure en quin procés es troba cada malalt (estat de immunodeficiència, possibles i més que probables tumors malignes etc, etc)
- 2.- Que desenvolupeu i que pugui fer-se de forma gratuïta un test per tal de determinar si els malalts i les seves famílies estan o no infectades.

3.- Sense més dilació iniciar un tractament, amb antiretrovirals, tot i que sigui en fase d'estudi - mes val això que no res- per tal de que la gent no empitjori o acabi morint de càncer en pocs anys.

Davant l'angoixa de tots nosaltres esperem la seva ràpida resposta.

Rebi una cordial salutació
Jose Luis (Barcelona)